

20<sup>e</sup>  
CONGRÈS  
NATIONAL

CNCGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

Exercer et enseigner la médecine générale



16 - 18 JUIN Bordeaux  
2021 PARC  
DES EXPOSITIONS



# EXPÉRIENCE DE GÉNÉRALISTES SENSIBILISÉS À LA GYNÉCOLOGIE, AUPRÈS DES FEMMES QUI ONT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES FEMMES (FSF)

*L. PICCON, E. MILLION, C. PERROLLAZ*

*PAS DE CONFLITS D'INTERET*



## INTRODUCTION

186  
9

Création du mot « homosexualité » en Prusse. Début de la psychiatrisation.

199  
2

Retrait du CIM10 de la pathologie « homosexualité »

201  
0

Premières recommandations gouvernementales françaises, énonçant la population FSF.

202  
0

Absence de recommandations médicales officielles françaises

La littérature évoque l'inconfort des FSF en consultation

20<sup>e</sup>  
CONGRÈS  
NATIONAL

CNCGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

Exercer et enseigner la médecine générale



16 - 18 JUIN Bordeaux  
2021 PARC  
DES EXPOSITIONS



## DÉFINITIONS

# Orientation sexuelle

# FSF



# PROBLÉMATIQUES ET INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ DES PATIENTES FSF

## Sous-dépistage du cancer du col de l'uterus

Brown R, McNair R, Szalacha L, Livingston PM, Hughes T. Cancer Risk Factors, Diagnosis and Sexual Identity in the Australian Longitudinal Study of Women's Health. Womens Health Issues Off Publ Jacobs Inst Womens Health. oct 2015;25(5):509-16.

## Risque d'IST non inférieur à toutes les femmes (excepté VIH)

Knight DA, Jarrett D. Preventive Health Care for Women Who Have Sex with Women. Am Fam Physician. 1 mars 2017;95(5):314-21.

## Transmission de vaginose bactérienne entre femmes

Forcey DS, Vodstrcil LA, Hocking JS, Fairley CK, Law M, McNair RP, et al. Factors Associated with Bacterial Vaginosis among Women Who Have Sex with Women: A Systematic Review. Plos One. déc 2015;10(12):e0141905.

## Fréquence augmentée de violence physique et sexuelle

Rothman EF, Exner D, Baughman A. The prevalence of sexual assault against people who identify as Gay, Lesbian or Bisexual in the United States: A systematic review. Trauma Violence Abuse. avr 2011;12(2):55-66

## Consommation augmentée d'alcool et de tabac

Cochran SD, Mays VM, Bowen D, Gage S, Bybee D, Roberts SJ, et al. Cancer-related risk indicators and preventive screening behaviors among lesbians and bisexual women. Am J Public Health. avr 2001;91(4):591-7.

## Risque augmenté de dépression et de suicide

Lhomond B, Saurel-Cubizolles M-J. Violence against women and suicide risk: The neglected impact of same-sex sexual behaviour. Soc Sci Med. 1 avr 2006;62(8):2002-13.



## OBJECTIFS ET METHODE

### Objectifs

- Comprendre l'expérience de généralistes, sensibilisés à la médecine de la Femme,

### Méthode

- Etude qualitative
- Echantillonnage ciblé
- Entretiens semi-dirigés
- Guide d'entretien
- Recueil jusqu' à saturation des données
- Analyse par thématisation continue



## RESULTATS

### Déroulé:


- Entretiens individuels
- Entre février et juin 2019
- Durée médiane de 25'04''

### Participant.es:

- 12 généralistes femmes de 29 ans à 70 ans
- Languedoc-Roussillon
- 8 ont suivi les cours du DIU de la faculté Montpellier-Nîmes
- Célibataire, mariées ou pacsées. 2 sans enfants. Athée ou catholiques.
- 1 médecin «homosexuelle», 11« hétérosexuelles »



# RÉSULTATS





## DISCUSSION

### Forces:

- Visibilise le sujet
- Choix de la méthodologie approche centrée sur le vécu des médecins

### Limites :

- Absence de participants masculins
- Désirabilité sociale
- Sujet méconnu et problématique pour les médecins



## DISCUSSION

**Une invisibilité des patientes empêchant la prise de conscience médicale**

**Des incohérences des pratiques actuelles**

**Distinguer les patientes , une nécessité, mais sous certaines conditions**



# PROPOSITION DE RECOMMANDATIONS

## IDENTIFIER DES PATIENTES VULNERABLES

- Distinguer n'est pas stigmatisant, est bénéfique et permet d'adapter sa pratique à sa patiente
- Attitude bienveillante et respectueuse envers la patiente

## UNE VIGILANCE ACCRUE DANS LE QUOTIDIEN

- Dépistages du cancer du col de l'utérus et des sérologies, à la fréquence de la population générale.
- Insister sur l'information de la patiente, en précisant verbalement « qu'on ait des rapports avec des hommes ou avec des femmes ».
- Vigilance sur les addictions, les violences et risque suicidaire.
- Discuter d'une contraception si rapports sexuels avec des hommes.

## NE PAS ABORDER LE SUJET SI INCONFORT, ORIENTER



## CONCLUSION

- **Des professionnels de Santé sensibilisés et intéressés par la Santé de la Femme, qui accueillent leurs patientes FSF, mais dans une situation inconfortable et informelle**
- **Cette position qui peut être une des origines d'inégalités que subissent cette population (dépistage irrégulier, appréhension à consulter, etc...)**
- **Des inégalités sociales de santé qui sont ainsi modifiables en travaillant pour et avec les généralistes. En leur donnant des outils, et en parallèle, l'importance d'améliorer la médecine communautaire et l'empowerment des patientes.**

20<sup>e</sup>  
CONGRÈS  
NATIONAL

CNCGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

Exercer et enseigner la médecine générale



16 - 18 JUIN Bordeaux  
2021 PARC  
DES EXPOSITIONS



MERCI POUR VOTRE ECOUTE