



Facteurs liés à la réalisation du frottis cervico-utérin chez les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes en France

Présentation CNGE 17 juin 2021 par le Dr Marianne MITROCHINE

Co-auteurs de l'étude


Dr Sylvie MAURICE
Pr Jean-Philippe JOSEPH
Dr Kevin OUZZANI

*Centre de Recherche Inserm
Département de médecine générale
Centre de recherche Inserm*

Université de Bordeaux



Human Papilloma Virus Oncogène




Cancer du col de l'utérus



Frottis cervico-utérin



Transmission sexuelle
du virus HPV




- *Tabac*
- *Multiplicité des partenaires*
- *Précocité des rapports sexuels*
- *Parité, utilisation prolongée contraceptifs oraux*
- *Co-infection avec une autre IST*
- *Immunodéficience*

« *Le HPV, ça ne se transmet que pendant les rapports hétérosexuels* »



Transmission sexuelle
du virus HPV

*Lors des relations sexuelles entre
femmes aussi !*



Les FSF

*= femmes ayant des relations sexuelles avec des
femmes*

- 1% des femmes en France
- 2 fois plus de tabac
- Activité sexuelle plus précoce
- Multiplicité des partenaires


MOINS DE FROTTIS

Question de recherche


Quels sont les facteurs liés à la réalisation du frottis cervico-utérin chez les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes en France ?

• **Enquête LESBICLEAR 2019.**

Enquête transversale anonyme



Diffusion en ligne du questionnaire



Les critères d'inclusion


- Femme
- Majeure
- En France
- Rapport avec une femme < 12 mois
- Questionnaire complet

Le critère de jugement principal

- Frottis < 3 ans
- Frottis > 3 ans
- Jamais de frottis

P < 20%

Modèle Multivarié




L'orientation sexuelle


- Auto-définie
- Ou**
- FSF exclu / année
 - FSF exclu / vie
 - FSFM année

« *Toute chose étant égale par ailleurs* »

Caractéristiques des participantes




Caractéristiques des participantes



Niveau d'études


Caractéristiques des participantes




Lieu de résidence

Caractéristiques des participantes




Orientation auto-définie



Profils de FSF



Réalisation du frottis cervico-utérin





Statut relationnel

- 75% en couple
- 96% des cas avec une femme
- **3,5 fois** plus de risque de retard de dépistage



Grossesse

- 24% de grossesses
- **10 fois** plus de chance d'être à jour



Contraception

- 52% déjà utilisé
- **3 fois** plus d'absence de dépistage si déjà utilisé



Rapport non protégé

- 48% antécédent rapport non protégé avec un H
- **3,5 fois** plus de risque de retard de dépistage

Connaissances et perceptions

● Pas de lien avec le niveau de connaissances

● Perception d'un moindre besoin de faire le frottis



OR 2,6
RETARD

● Méconnaître son risque d'infection à HPV

OR 9,7
RETARD

Recommandation médicale



« Un médecin vous a-t-il déjà recommandé de réaliser le frottis ? »



3 fois plus de probabilité d'être à jour

Recommandation médicale

« Un médecin vous a-t-il déjà dit que le frottis n'était **pas nécessaire** en raison de votre orientation sexuelle ? »



3,7 fois plus de risque de retard

6 fois plus de risque de n'avoir jamais fait de frottis

Limites et forces de l'étude



Échantillon non randomisé

Biais de volontariat

Biais de désirabilité sociale

Chronologie parcours de soins /
orientation sexuelle

Manque d'inclusivité



Recrutement sur internet

Effet boule de neige

Taille de l'échantillon

Anonymat

Rapport < 12 mois

Questionnaire pédagogique


Etude originale ++++++

**Première étude
en France**

Des taux bas de dépistage

Enquête LESBICLEAR 2019

65% frottis < 3 ans dont :



Baromètre santé 2005

Enquête en population générale

83%

Discussion des résultats

Rôle incitatif

OR 3
À JOUR

Méconnaissance, manque
de formation, contrainte
de temps, ouvrir la boîte
de pandore, homophobie,
inconfort ...

Rôle dissuasif

OR 3,7 RETARD
OR 6 JAMAIS



LE MEDECIN AU CŒUR DU SUJET

Implications en santé publique

Occasions à saisir

- Contraception
- Grossesses
- IST



Pas d'actions possibles

- Statut relationnel
- Genre des partenaires

Actions possibles

- Perceptions
- Recommandations médicales

Conclusion



Formation médicale



**Envoi postal de kits
d'auto-prélèvement**



**Visibilité dans les
campagnes de prévention**



MERCI