Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Vécu des patientes et patients traités par opioïdes faibles face au risque d'addiction

Dr Déborah Seale – Dr Philippe Grunberg – Bernadette Pléchot



• Strasbourg • Reims • Dijon • Nancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Pas de lien ou conflit d'intérêt à déclarer.

Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Introduction:



1 personne/6



+ 150 % surdosage



Faibles ≈ forts

Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024



Ambivalence efficacité vs. addiction

Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024



Ambivalence efficacité vs. addiction



- Mise en échec
- Banalisation du tramadol

Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024



Ambivalence efficacité vs. addiction



- Mise en échec
- Banalisation du tramadol



- « Drogue »
- Manque d'information
- Connaissance ≠ perception risque

Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024



Quel est le **vécu** des personnes traitées par **opioïdes faibles**, en particulier leur ressenti face au **risque d'addiction**?

• Strasbourg • Reims • Dijon • Nancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Méthode: étude qualitative



Entretiens semi-dirigés → ouverts



Échantillonnage raisonné homogène



Analyse phénoménologique interprétative

Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Résultats: Population



- 6 femmes 4 hommes
- 30 à 90 ans
- CAP BEP à > Bac +2



- Tramadol, codéine ou poudre d'opium
- Douleurs musculosquelettiques, céphalées
- Occasionnel ou pluriquotidien



- 2 mois à > 15 ans (surtout chronique)
- 3 personnes : antécédents opioïdes forts

Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg
Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Résultats: Population



- 6 femmes 4 hommes
- 30 à 90 ans
- CAP BEP à > Bac +2



43 minutes




- Tramadol, codéine ou poudre d'opium
- Douleurs musculosquelettiques, céphalées
- Occasionnel ou pluriquotidien



- 2 mois à > 15 ans (surtout chronique)
- 3 personnes : antécédents opioïdes forts





« de la douleur, de la douleur ! Elle m'a tellement paralysée, tellement... pff... j'avais pas le goût à rien, à rien du tout... [...] Y avait que ma douleur. Alors il faut aller s'allonger [...] et rester là comme une bébête, à, à, à penser à mon mal... Presque ça m'a traumatisée »

Menace de la douleur

Menace de la douleur

« mais quand ça revient paf!
[claquement de doigts]
heureusement que tout le temps, faut tramadol »

P6

Peur de la douleur : Traumatisme Médicament tout-puissant

Peur de la douleur : Traumatisme Médicament tout-puissant

« Heureuse! Mais je vous dis, ce médicament, je ne sais pas qu'est-ce qu'il provoque plus tard, je n'en sais rien, mais c'est un don du ciel, croyez-moi! »

Médicament tout-puissant

Peur de la douleur :

Traumatisme

Recevoir l'information (ou pas)

Peur de l'addiction

« ça m'a tout de suite fait penser à une personne qui se **drogue** et... [...] je regarde la télé comme tout le monde et **ça fait peur** » **P1**

Entrée dans la maladie : Recevoir l'information (ou pas) Médicament tout-puissant Déni du Peur de la douleur :

Traumatisme

risque

Recevoir l'information (ou pas)

Peur de la douleur : Traumatisme Médicament tout-puissant

Déni du risque

« j'ai dit bon on se drogue quelque part, mais bon [...] c'est-à-dire, c'est **pas dangereux** [...], j'ai jamais eu des effets par exemple, je sais pas moi... comment on peut... comme un **drogué** quoi. Jamais. »

P4

Peur de la douleur :
Traumatisme

Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction :
Déni du risque

Contrôler deux peurs : dilemme

Recevoir l'information (ou pas) :

Peur de la douleur : Traumatisme Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction : Déni du risque

« [...] Et ben je suis bien, ça va, j'ai pas pris. Le lendemain j'ai **tellement peur** que je **reprends!** [rire] [...] si je ne prends pas le, la gélule [...], est-ce que la sciatique **revient comme avant?** C'est ça la peur. »

Recevoir l'information (ou pas) :

Peur de la douleur : Traumatisme Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction : Déni du risque

Manque de communication

« Mais donc voilà j'ai toujours été assez étonnée qu'on pose pas plus de questions, ou... et en tout cas qu'on **sensibilise pas** à la prise de médicaments... enfin ces médicaments-là. » Peur de la douleur :
Traumatisme

Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction :
Déni du risque

Alliance thérapeutique et empowerment

Recevoir l'information (ou pas) :

Peur de la douleur : Traumatisme Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction : Déni du risque

Alliance thérapeutique et empowerment

« Après le médecin il m'a dit : « non, non, c'est pas une drogue, ça dépend la façon dont tu prends. [...] on vous donne ça pour prendre un certain moment mais après il... tu vas arrêter. » »

Recevoir l'information (ou pas) :

Peur de la douleur : Traumatisme Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction : Déni du risque

Alliance thérapeutique et empowerment

« Oui parce que quand y a trop de choses dans la tête là, il faut essayer de voir quelqu'un à parler [...] **Dès que tu parles** seulement, **ça passe** » Peur de la douleur :
Traumatisme

Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction :
Déni du risque

Alliance thérapeutique et empowerment

Recevoir l'information (ou pas) :

Peur de la douleur : Traumatisme Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction : Déni du risque

Alliance thérapeutique et empowerment

« Faut vivre avec! Donc les comprimés ça nous, ça nous... ça diminue la douleur. Et ça n'apporte pas la guérison. »

Peur de la douleur :
Traumatisme

Médicament tout-puissant

Déni du risque

Recevoir l'information (ou pas) :

Se sentir capable d'intégrer le risque

Alliance thérapeutique :

Peur de la douleur : Médicament tout-puissant


Traumatisme

Peur de l'addiction : Déni du risque Recevoir l'information (ou pas):

Se sentir capable d'intégrer le risque

« Non, mais justement là **comme je voudrais** arrêter, on va bien **en parler**. »

Alliance thérapeutique :





Médicament

Peur de l'addiction : Déni du risque

Accompagner le changement

« J'en ai peut-être **moins besoin**. Je vais voir, on va **discuter**. [...] quitte si ça me réveille, et ben je prends le Doliprane® et puis voilà [...] »

Se sentir capable: Intégrer le risque

Alliance thérapeutique :

Recevoir l'information (ou pas) :

P9

Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction : Déni du risque

Nouvel équilibre

Peur de la douleur :


Traumatisme

« Bon une gélule, moi je pense... je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est pas tellement dangereux [...] **je me suis fixée ça** [...] j'ai respecté, et ça a été, franchement ça a été. **Ça a marché**. »

Se sentir capable : Intégrer le risque

Alliance thérapeutique :

Recevoir l'information (ou pas) :



Intégrer le risque

Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction : Déni du risque

Peur de la douleur :

Traumatisme

Dialogue intérieur : Prise en compte du risque d'addiction

« je parle hein dans ma **tête**, il y a **beaucoup de choses qui trottinent** :

« Ah demain toute la semaine, je vais pas prendre Izalgi®. » »

Se sentir capable : Intégrer le risque

Alliance thérapeutique :

Recevoir l'information (ou pas) :

P4

- Vivre sous la menace de la douleur
- Perte d'autonomie
- Libération, contrôle et réassurance grâce aux Of
- Espérer la guérison

Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction : Déni du risque

Recevoir l'information (ou pas) :

- Médias anxiogènes
- Stigmatisation
- Manque de communication sur Of
- Rupture relation/suivi

Dialogue intérieur : Prise en compte du risque d'addiction

Instauration d'un nouvel équilibre:

- Se libérer de la douleur
- Ne pas envisager
 « vivre sans Of »
- « Vivre avec » la maladie, les effets indésirables

Contrôler / arrêter sa consommation

Peur de la douleur :

Traumatisme

Empowerment

Se sentir capable : Intégrer le risque

Alliance thérapeutique :

- Comprendre les Of
- Deuil de la guérison
- Réassurance
- Rompre l'isolement
- Percevoir l'amélioration



• Strasbourg • Reims • Dijon • Nancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Discussion:

Ambivalence anxiogène : idem opioïdes forts

Déni du risque : difficulté d'intégration du risque
 = simple étape ?

- Sentiment d'efficacité personnelle
 - = levier d'adaptation : douleur + risque addiction

Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Forces et limites

- COREQ/SRQR et journal de bord
- Avis comité d'éthique
- Triangulation
- Durée entretiens
- Soins primaires

- Chercheuses novices
- Entretiens semi-dirigés
- Prise en charge aiguë



• Strasbourg • Reims • Dijon • Nancy • Besançon







Strasbourg
Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Conclusion:

- Pas de banalisation
- Perte d'autonomie et manque d'information
- Sentiment d'efficacité personnelle + acceptation

Ne pas envisager de « vivre sans »



Apprendre à « vivre avec »

Strasbourg • Reims • DijonNancy • Besançon







Strasbourg

Palais de la musique et des congrès

20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2024

Merci!

- Vivre sous la menace de la douleur
- Perte d'autonomie
- Libération, contrôle et réassurance grâce aux Of
- Espérer la guérison

Peur de la douleur : Médicament tout-puissant

Peur de l'addiction : Déni du risque

Recevoir l'information (ou pas) :

- Médias anxiogènes
- Stigmatisation
- Manque de communication sur Of
- Rupture relation/suivi

Dialogue intérieur : Prise en compte du risque d'addiction

Instauration d'un nouvel équilibre:

- Se libérer de la douleur
- Ne pas envisager
 « vivre sans Of »
- « Vivre avec » la maladie, les effets indésirables

Contrôler / arrêter sa consommation

Traumatisme

Empowerment

Se sentir capable : Intégrer le risque

Alliance thérapeutique :

- Comprendre les Of
- Deuil de la guérison
- Réassurance
- Rompre l'isolement
- Percevoir l'amélioration